

# Informacje dla właścicieli pasiek

Dotyczy stosowania wyłącznie preparatu **AQUA K-OTHRINE**, jako środka do odkomarzania metodą naziemną.

**Właściwie przeprowadzony zabieg preparatem AQUA K-OTHRINE (zabieg wykonany o odpowiedniej porze dnia, dawkowany zgodnie z zaleceniami na etykiecie), stanowi minimalne zagrożenie dla pszczół.**

**W przypadku zwalczania komarów innymi preparatami, należy zwrócić się do ich producentów, o informacje dotyczące stosowania i ewentualnego zagrożenia dla pszczół.**

- Zabiegi odkomarzania, metodą ultra nisko objętościowego zamgławiania przestrzeni, powinny być wykonywane w godzinach popołudniowych po oblocie pszczół (na ogół jest to po godzinie 18-ej).

- Właściciele pasiek oraz wykonujący zabieg odkomarzania, powinni skontaktować się wzajemnie w celu przekazania informacji o miejscach gdzie usytuowane są ule. W czasie zabiegu, ule najlepiej jest zamknąć lub w inny sposób uniemożliwić wydostawanie się pszczół.

- Wykonujący zabiegi powinni przed zabiegiem rozpoznać miejsca występowania uli i w odległości 100 m przed i 100m za wyłączyć i włączyć zabieg zamgławiania przestrzennego. Należy pozostawić 100m strefę ochronną w miejscach gdzie występują roje.

- Ze względu na to, że zabieg wykonywany jest po oblocie pszczół, dawka preparatu AQUA K-OTHRINE jest bardzo mała (1 g substancji czynnej na hektar) oraz rodzaj zabiegu – mgła unosząca się w przestrzeni przez około 4-5 godzin powoduje, że zagrożenie dla ukrytych w tym czasie pszczół w ulach jest minimalne.

- Unosząca się przez maksymalnie 4-5 godzin w godzinach nocnych, w przestrzeni, mgła preparatu zostaje rozniesiona przez prądy powietrza oraz odparowana, a pozostałości preparatu są zminimalizowane, przez co następnego dnia po zabiegu nie występuje zagrożenie dla żerujących pszczół.

Aqua K-Othrine